



## پایش مراقبت کودک پسر

در هر مراجعه به واحد بهداشتی درمانی / مطب / مرکز غربالگری کارت مراقبت کودک را به همراه داشته باشید.



نام و نام خانوادگی کودک: .....
تاریخ تولد: روز..... ماه..... سال.....
کد ملی کودک: .....
کد ملی سرپرست کودک: .....
مشخصات زمان تولد: وزن..... دور سر..... قد.....
هفته بارداری هنگام زایمان: .....
تلفن تماس: .....
تاریخ مراجعته بعدی: روز..... ماه..... سال.....

- برای غربالگری پس از تولد، روز سوم تا پنجم به نزدیک ترین مرکز خدمات جامع سلامت / پایگاه سلامت / خانه بهداشت محل زندگی خود مراجعت کنید.
- در سنین ۳ تا ۵ هفته‌گی، ۱۲، ۱۵، ۱۲، ۹، ۷، ۶، ۴، ۲، ۱ و ۱۸ ماهگی، ۲، ۵ و ۵ سالگی برای مراقبت کودک خود مراجعت کنید.
- شیر مادر هیچ جایگزینی ندارد. تا پایان ۶ ماهگی کودکتان را فقط با شیر مادر تغذیه کنید و پس از آن مطابق توصیه‌های تغذیه‌ای، غذای کمکی را شروع کرده و شیر مادر را ادامه دهید.
- در سنین ۲، ۴، ۶، ۱۲ و ۱۸ ماهگی و ۶ سالگی برای واکسیناسیون کودک خود مراجعت کنید.
- به علائم هشدار دهنده تکامل کودک در سنین مختلف توجه کنید.
- به توصیه‌های مراقبت از تکامل کودک عمل کنید.
- پرسشنامه غربالگر تکامل ASQ را در سنین ۶، ۱۲، ۲۴، ۳۶ و ۶۰ ماهگی کودکتان از پژشک / مراقب سلامت / بهورز دریافت کنید. بعد از تمرین مناسب با کودکتان، به سوالات این پرسشنامه به دقت پاسخ دهید و سپس تحويل دهید.

## غربالگری‌های کودک

آزمون غربالگری	تاریخ انجام غربالگری	نتیجه غربالگری	نیازمند ارجاع	نام یا مهر غربالگر
هیپوتیروئیدی				
فنیل کتونوری				
شناوی				
بینایی				

پرسشنامه ASQ	۶ ماهگی	۱۲ ماهگی	۲۴ ماهگی	۳۶ ماهگی	۶۰ ماهگی
نمره حیطه ارتیاط					
نمره حیطه حرکات درشت					
نمره حیطه حرکات ظرفیت					
نمره حیطه حل مسئله					
نمره حیطه شخصی- اجتماعی					
وجود نگرانی در قسمت کلیات					
نمره ASQ:SE					
کودک نیازمند ارجاع					

## با واکسیناسیون به موقع، سلامت کودک خود را تضمین کنید.

جدول راهنمای واکسیناسیون

سن	نوع واکسن	سن	نوع واکسن
بدو تولد	ب ث ژ - فلچ اطفال خوارکی - هپاتیت ب	۱۲ ماهگی	MMR
۲ ماهگی	فلچ اطفال خوارکی - پنج گانه *	۱۸ ماهگی	سه گانه - فلچ اطفال خوارکی - MMR
۴ ماهگی	فلچ اطفال خوارکی - پنج گانه - فلچ اطفال تزریقی	۶ سالگی **	سه گانه - فلچ اطفال خوارکی
۶ ماهگی	فلچ اطفال خوارکی - پنج گانه - فلچ اطفال تزریقی		

توضیحات: \* واکسن پنج گانه شامل دیفتتری، کراز، سیاه سرفه، هپاتیت ب، هموفیلوس آنفولانزا تیپ ب می باشد.  
\*\* پس از آخرین نوبت واکسن سه گانه، هر ده سال یکبار واکسن دوگانه بزرگسالان باید تزریق شود.

جدول تقویم واکسیناسیون

ب ث (BCG)	ب د (DTP)	ب د (DTP-Hib)	نام یا مهر واکسیناتور	نوع واکسن	تاریخ مراجعه	سریال واکسن	نام یا مهر واکسیناتور	تاریخ مراجعه	سریال واکسن	نوع واکسن	نام یا مهر واکسیناتور	تاریخ مراجعه	سریال واکسن	
بدو تولد				بار اول										
بار اول				بار دوم										
بار دوم				بار سوم										
بار دوم				بار اول										
بار سوم				بار دوم										
یادآور ۱				بار اول										
یادآور ۲				بار دوم										
بار اول				بدوتولد										
بار دوم														

- سرماخوردگی یا اسهال خفیف مانع انجام به موقع واکسیناسیون نیست.
- قبل از ترک مرکز تاریخ واکسیناسیون بعدی راسوال کنید. پس از انجام واکسیناسیون حداقل ۲۰ دقیقه در مرکز واکسیناسیون حضور داشته باشید.
- جهت تسکین درد، بی قراری با تقب راهنمایی لازم را از واکسیناتور سوال فرمایید. در صورت تب بالا یا هر گونه عارضه شدید یا غیر معمول به واحد ارائه خدمات بهداشتی درمانی مراجعه فرمایید.

## نوزاد تا پایان شش ماهگی

تفصیلی از تغذیه باشندگان  
شیرخواره تا ۱۲ ماه در روش این  
پر انسان متابل و فناور

## شروع ماه هفتم تا پایان ماه هشتم

شیرخواره غذایی کمکی که از ۱۲ قاشق شیر خواره مذکور شد و بد نظرش بحسب مولف  
۲ میلی لیتر شیر خواره دفعت آن افزایش زده می‌گردید  
+ ۱۲ میان و عده ممنوع



## شروع ماه نهم تا پایان ماه یازدهم

غذایی کوچک سنت با خطر شکنی پنهانی کوچک (ذلاخنا) با قدرت کوچک (ذلاخنا) به کوتکتان بدید.  
غذایی کوچک (ذلاخنا) مدت از ۱۳ تا ۱۴ وعده در روزه دفعه نصف لیوان (۱۵۰ سیلی) و

- شیر مادر به تنهایی تا پایان ماه ششم زندگی برای تغذیه شیرخواره کافی است، تا ۶ سالگی ادامه دهد.
- از ۶ ماهگی تا پایان یک سالگی ابتدا کودکان را با شیر مادر تغذیه کنید و سپس به او غذا بدهید.
- تغذیه تکمیلی را از یک نوع ماده غذایی به مقدار ۲ تا ۳ قاشق غذاخوری ۲ تا ۳ بار در روز شروع کنید و سپس این مقدار را به نصف لیوان برسانید.
- اضافه کردن هر ماده غذایی جدیدی را طی ۵ روزانجام دهد.
- از به زور غذا دادن به کودکان "پرهیز کنید.



شیر مادر  
در شباهه روز  
۸ تا ۱۲ بار



## شروع دوازده ماهگی تا پایان پنج سالگی



- شیر مادر را بطبق میل کودک ادامه دهید. ابتدا به کودکتان غذا بدھید و سپس او را با شیر مادر تغذیه کنید.
- از «به زور غذا دادن به کودکتان» پرهیز کنید.
- غذاهای متنوع شامل لبندیات، گوشت، میوه و سبزی، غلات و حبوبات بدھید.
- تا ۲ سالگی لبندیات پر چرب و پس از آن لبندیات کم چرب بدھید.
- طی روز آب تمیز و سالم به کودک بدھید.
- ۳ تا ۴ نوبت در روز و هر روز تقریباً به اندازه یک لیوان به کودک غذا بدھید. (معده کودک کوچک است و نیاز به دفعات بیشتری برای تغذیه دارد).
- ۱ تا ۲ بار میان وعده مغذي در بین وعده های اصلی غذا به او بدھید.
- قطره ویتامین و آهن را تا پایان ۲ سالگی ادامه دهید.
- زمان غذا خوردن کنار کودکتان باشید.
- غذا را در قطعات کوچک آماده کرده و به کودک بدھید «تا بتواند خودش آن ها را بخورد»
- همیشه قبل از تهیه غذا و قبل از دادن غذا به کودک، دست های خود را با آب و صابون بشویید.
- قبل از دادن غذا به کودک دست و صورت او را بشویید و از ظرف و قاشق تمیز و جداگانه برای کودک استفاده کنید.
- دادن غذاهای آماده و تجاری به کودک ضرورت ندارد، غذاهای خانگی مناسب هستند. از غذاهای سفره خانواده به کودک بدھید.
- به کودکتان آب میوه و نوشیدنی های تجاری ندهید. این ها ارزش غذایی نداشته و به رشد کودک کمک نمی کنند.
- به کودکتان غذاهای غیر سالم مانند چیپس و پفک ندهید.

## علائم هشدار دهنده تکامل


- نمی تواند با کمک بنشیند.
- غان و غون نمی کند (دوراً درن صداهایی مانند «ماما»، «بابا»، «دادا»)
- در هیچ نوع بازی از جمله بازی تعاملی شرکت نمی کند.
- با شنیدن اسم خودش، پاسخی نمی هد.
- به نظر نمی رسد افراد آشنا را از غریبیه ها تشخیص دهد.
- به طرفی که شما اشاره می کنید نگاه نمی کند.
- اشیا را دست به دست نمی کند.

۹ ماهگی

- به صداهای بلند پاسخ نمی دهد.
- اشیای در حال حرکت را با نگاه دنبال نمی کند.
- به اشخاص لبخند نمی زند.
- دستش را به دهان نمی برد.
- وقتی روی شکم خوابیده و او را از زمین بلند می کنیم نمی تواند سرش را بالا بیاورد.
- مکیدن یا بلعیدن ضعیف دارد.

۲ ماهگی

- نمی تواند چهار دست و پا برود.
- نمی تواند با کمک بایستد.
- برای پیپاردن اشیایی که می بیند شما آن ها را پنهان می کنید تلاش نمی کند.
- کلمه کوتاه مثل ماما یا بابا را نمی گوید.
- بای بای یا سرسری کردن را یاد نمی گیرد.
- به اشیا اشاره نمی کند.
- مهارت هایی را که قبل اکسب کرده از دست می دهد.

۱ سالگی

- نمی تواند سرش را ثابت نگه دارد.
- نمی تواند ببغوغ کند یا صداهای دیگری با دهانش تولید کند.
- وقتی او را به حالت ایستاده روی یک سطح سفت قرار دهیم، نمی تواند با پاهایش به سمت پایین فشار وارد کند.
- نمی تواند یک یا هر دو چشم مش را در همه جهات حرکت دهد.

۴ ماهگی

- با اشاره کردن به سمت اشیا، آن ها را به دیگران نشان نمی دهد.
- نمی تواند راه برود.
- موارد کاربرد اشیای آشنا را نمی داند.
- نمی تواند کارهای دیگران را تقلید کند.
- کلمات جدید را یاد نمی گیرد.
- نمی تواند حداقل ۶ کلمه بگوید.
- وقتی مراقب اوراتک می کند یا پیش او برمی گردد، توجه نمی کند یا اهمیت نمی دهد.
- مهارت هایی را که قبل ا به دست آورده بود از دست می دهد.

۱۸ ماهگی

- تلاش نمی کند که دستش را به اشیایی که در دسترس قرار دارند برساند.
- توجهی به مراقب خود نمی کند.
- به صداهای اطرافش واکنش نشان نمی دهد.
- به هیچ طرف غلت نمی زند.
- نمی خنده یا جیغ نمی کشد.
- عضلاتش به نظر خیلی سفت می رسد.
- عضلاتش به نظر خیلی شل است (مثل یک عروسک پارچه ای)

۶ ماهگی


## علاوه هشدار دهنده تکامل

<ul style="list-style-type: none"> <li>• نمی تواند درجا بپردازد.</li> <li>• سایر کودکان را نادیده می گیرد یا به افرادی غیر از اعضای خانواده، پاسخ نمی دهد.</li> <li>• در مقابل لباس پوشیدن، خوابیدن یا دستشویی رفتن مقاومت می کند.</li> <li>• نمی تواند یک داستان مورد علاقه اش را بازگویی کند.</li> <li>• نمی تواند از دستورات ۳ مرحله ای پیروی کند.</li> <li>• مفهوم «همان / مشابه» و «متفاوت» را رک نمی کند.</li> <li>• از ضمایر من و تو درست استفاده نمی کند.</li> <li>• گفتار واضحی ندارد.</li> <li>• مهارت هایی را که قبلاً به دست آورده بود از دست می دهد.</li> </ul>	<p>۴ سالگی</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• از عبارت های ۲ کلمه ای استفاده نمی کند (مثال: شیر می خورم)</li> <li>• کاربرد اشیای معمولی مثل مسواک، تلفن یا قاشق و چنگال را نمی داند.</li> <li>• قادر به انجام دستورات ساده نیست.</li> <li>• خودش به تنهایی راه نمی رود.</li> <li>• مهارت هایی را که قبل از کسب کرده از دست می دهد.</li> </ul>	<p>۲ سالگی</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• نمی تواند طیف وسیعی از عواطف را نشان دهد.</li> <li>• رفتارهای افراطی از خود نشان می دهد مثل حالت های غیر معمول ترس، خجالت، افسردگی یا رفتارهای جمی.</li> <li>• معمولاً گوشه گیر و غیرفعال است.</li> <li>• براحتی حواسش پرت می شود و نمی تواند بیش از ۵ دقیقه روی یک موضوع تمیکر کند.</li> <li>• به مردم پاسخ نمی دهد یا پاسخ سرسری می دهد.</li> <li>• قادر به انجام بسیاری از بازی ها و فعالیت ها نیست.</li> <li>• نمی تواند نام و نام خانوادگی خود را بگوید.</li> <li>• نمی تواند افعال جمع یا گذشته را درست بکار ببرد.</li> <li>• نمی تواند در مورد فعالیت های روزانه یا تجارتی صحبت کند.</li> <li>• نمی تواند نقاشی بکشد.</li> <li>• نمی تواند بدون کمک دندانش را مسواک کند، دست و صورتش را بشوید و خشک کند یا لباس بپوشد.</li> <li>• مهارت هایی را که قبل از کسب کرده از دست می دهد.</li> </ul>	<p>۵ سالگی</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• زیاد زینگ می خورد یا نمی تواند از پله استفاده کند.</li> <li>• آبرینش دهان دارد یا گفتارش خیلی نامفهوم است.</li> <li>• نمی تواند با اسباب بازی های ساده مانند جورچین ساده بازی کند.</li> <li>• نمی تواند جمله بگوید.</li> <li>• بازی تخیلی نمی کند یا آن ها را باور می کند.</li> <li>• نمی خواهد با سایر کودکان یا اسباب بازی ها بازی کند.</li> <li>• تماس چشمی برقرار نمی کند.</li> <li>• مهارت هایی را که قبل از کسب کرده از دست می دهد.</li> </ul>	<p>۳ سالگی</p>


## توصیه های ارتقای تکامل کودک

نوزاد تولد تا یک هفتگی	۱ هفته تا ۶ ماه	۶ ماه تا ۹ ماه	۹ ماه تا ۱۲ ماه	۱۲ ماه تا ۲ سال	۲ سال و بزرگتر
<p><b>بازی:</b> کودک خود کمک کنید تا اشیا را بشمارد، نام ببرد و مقایسه کند. برای او اسباب بازی های ساده پسازید. مثلاً اشیایی بارنگ ها و شکل های متفاوت برای دسته بندی، برچسب یا تخته وایت برد و پازل.</p> 	<p><b>بازی:</b> چیزهایی به کودک بدهید تا روی هم بجیند و داخل ظرف بیاندازد و در یاورد.</p> 	<p><b>بازی:</b> اسباب بازی مورد علاقه کودک را زیر پا چه یا جعبه پنهان نمونه اسباب بازی: اشیایی که داخل هم یا روی هم می گذارند، پیدا کرد. با کودک خود دالی طرف و گیره های لباس.</p> 	<p><b>بازی:</b> وسائل خانگی تمیزو بی خطری را به کودک خود بدهید تا دستکاری کند، به کنید. بینید آیا می تواند ان را پیدا کرد. با کودک خود دالی موشه بازی کنید.</p> 	<p><b>بازی:</b> فرصل هایی را برای کودک خود فراهم کنید تا بینند، بشنوند، حس کند، آزادانه حرکت کند و شما را لمس کند. اشیای رنگی را به آرامی جلوی او حرکت دهید تا هم بزند و بیاندازد (مانند یک طرفه بزرگ که با یک نخ آویزان شده است، غ Jegheh فلزی)</p> 	<p><b>بازی:</b> کودک خود فراهم کنید تا بشنوند، پیشند، آزادانه حرکت کند و شما را نوزاد خود فراهم کنید تا بینند، آن را بینند و بگیرد (مانند یک حلقه بزرگ که با یک نخ آویزان شده است، غ Jegheh فلزی)</p> 
<p><b>ارتباط برقرار کنید:</b> او را شوپیکنید تا صحبت کند و به سوالات او پاسخ دهد. به کودکتان داستان، آواز و بازی یاد بدهید. در مورد تصاویر یا کتاب های او صحبت کنید. نمونه اسباب بازی: کتاب شکل دار</p> 	<p><b>ارتباط برقرار کنید:</b> سوالات ساده از کودک پرسید. به تلاش های کودک خود در صحبت کردن جواب بدهد.</p> 	<p><b>ارتباط برقرار کنید:</b> نام اشیا و افراد را به کودک بگویید. به او یاد بدهید که جگونه با دست هایش اشیا، طبیعت و تصاویر را به او نشان دهد و درباره آن ها با او صحبت کنید.</p> 	<p><b>ارتباط برقرار کنید:</b> به کودک خود لبخند بزنید و بخندید. با او صحبت کنید. با پاسخ دهد. نام کودک را صدا باز و پاسخ او را بینید.</p> 	<p><b>ارتباط برقرار کنید:</b> به چشمان کودک خود نگاه کنید و با او صحبت کنید. زمان تغذیه با شیر مادر فرست خوبی است. حتی یک نوزاد هم صورت شما را می بینند و صدایتان را می شنوند.</p> 	<p>به کودک خود محبت کنید و عشقتنان را به او نشان دهید. تلاش کودکان را در یادگیری مهارت های جدید تحسین کنید.</p>


## نمودار دور سر برای سن از تولد تا ۲ سالگی (z-score) پسر





## نمودار وزن برای قد از تولد تا ۵ سالگی (Z-Score) پسر



## نمودار قد برای سن از تولد تا ۵ سالگی (Z-Score) پسر





## نمودار وزن برای سن از تولد تا ۵ سالگی (Z-score) پسر